

RS فيروس

أساساً RS غالباً ما يؤدي إلى نزلات برد خفيفة فقط. نشاهد معظم حالات العدوى بفيروس RS هو أكبر مسبب لنزلات البرد عند الأطفال. العدوى بفيروس RS فيروس في أشهر الخريف والشتاء. سواء لدى البالغين والأطفال يؤدي هذا الفيروس عموماً لنزلات برد خفيفة. الأطفال الرضع بين شهر واحد وستة أشهر يمكن أن يمرضوا بسببه أكثر

الأعراض

:بالاعراض التالية SR لدى الأطفال تبدأ الإصابة بفيروس

.نزلة برد مع السعال، العطس، سيلان الأنف وحمى خفيفة

يشفى معظم الرضع بعد حوالي أسبوعين. ومع ذلك، بعض الرضع يصاب أيضاً في الجهاز التنفسي السفلي، مما يسبب التهاب القصبات أو الالتهاب الرئوي. هذا قد

:يسبب مشاكل في التنفس يمكن التعرف عليها كالتالي

التنفس بوتيرة سريعة

طفلك يصبح لونه أزرق عند ضيق في التنفس

.مشاكل في الرضاعة و التغذية

.وهناك حالات ينصح فيها بزيارة طبيب الأسرة الخاص بك. اعتماداً على الحالة، يمكنك تحديد موعد للاستشارة أو استدعاء الطبيب مباشرة للتشاور

:موعد لطفلك لدى طبيب الأسرة دون استعجال

طفلك هو أصغر سناً من ثلاثة أشهر ولديه حمى أكثر من 38 درجة مئوية

طفلك هو أكبر سناً من ثلاثة أشهر ولديه حمى أكثر من 38 درجة مئوية لأكثر من ثلاثة أيام ، و/أو

طفلك هو أقل من سنتين، ويبدو أنه يعاني من الأذنين، و/أو

طفلك أصغر من 6 أشهر من العمر ويرضع أقل من نصف الكمية العادية، و/أو

طفلك يعاني من حمى متكررة لأكثر من 38 درجة مئوية

.الأعراض المذكورة أعلاه قد تشير إلى مضاعفات ناتجة عن نزلة البرد. ومن المهم أن طفلك يراها الطبيب

!موعد لطفلك لدى طبيب الأسرة باستعجال

طفلك مرتخي و لا يستجيب بشكل جيد لمحيطه، و/أو

طفلك يبكي بضعف و/أو انين ويصعب اسكاته، و/أو

طفلك يعاني من احتناق، و/أو

طفلك لديه بقع على الجلد او نزيف جلدي داخلي وهو مريض جداً، و/أو

طفلك يعاني من ألم شديد إذا قمت برفع ساقيه أثناء تغيير الحفاض

قد تشير هذه الأعراض إلى مضاعفات خطيرة لنزلة البرد. ان كان لدى طفلك أعراض أخرى تثير شكك، أو تجعلك تشعرين بقلق كبير، يمكنك أيضاً بالطبع الاتصال

.بطبيبك

